

Anti-Heme Oxygenase-1 (GTS-3), Monoclonal

Code No. M175

Size : 0.1 mg Mouse Ig

Subclass : IgG1

* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

Source :

Monoclonal antibody was obtained by fusing the mouse myeloma cell-line P3U1 with spleen cells of BALB/c mouse after immunization with microsome of the transformed mouse T cell transfected rat heme oxygenase-1 (WR19LrHO-1). The monoclonal antibody was harvested from ascitic fluid.

Purification :

Antibody was purified by column chromatography, dissolved in 10 mM PBS, pH 7.4, containing 1.0% bovine serum albumin, and then lyophilized. The lyophilized antibody does not contain preservative.

Form : Lyophilized

Reconstitution :

Dissolve the lyophilized antibody in 50 μ l of distilled water (final concentration: 2.0 mg/ml). This solution can be used as a stock solution. If dilution is necessary for your application, dilute the stock solution with the following Dilution solution just prior to use. When the entire amount of antibody is to be used over a short time period, it may be dissolved directly in 500 μ l or more of the Dilution solution.

Note (1) : Be sure to store the antibody at a minimum concentration of 2.0 mg/ml. A lower antibody concentration may result in decreased stability.

Note (2) : Reconstituted antibody solution should contain 0.1% sodium azide as a preservative when stored at 4°C.

Dilution solution :

10 mM PBS (pH 7.4)
1.0% BSA
(0.1% NaN₃) *

* When stored at 4°C, 0.1% sodium azide should be added as a preservative.

Specificity:

- This antibody reacts with human and rat heme oxygenase-1.
- This antibody does not react with rabbit and mouse heme oxygenase-1.
- This antibody does not crossreact with heme oxygenase-2.
- This antibody inhibits the activity of human and rat heme oxygenase-1.

Working concentration :

5 - 10 μ g/ml

(For Western blotting and immunohistochemical staining by color detection)

For human paraffin embedded tissue ; GTS-1 (Cat. #M174)

For rat paraffin embedded tissue ; GTS-3 (Cat. #M175)

Storage : 4°C

This product does not contain preservative.

The stock solution (2.0 mg/ml) should be stored in aliquots at -20°C for 1 year, or should be stored at 4°C for 6 months after adding 0.1% sodium azide. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Diluted antibody should not be stored.

Application:

- Detection of heme oxygenase-1 by Western blot analysis
- Immunohistochemical detection of heme oxygenase-1 on paraffin embedded * or frozen tissue sections
 - * Antigen retrieval : Proteinase K treatment
- Inhibition assay of heme oxygenase-1 activity

References:

- 1) Goda N, *et al.* Distribution of heme oxygenase isoforms in rat liver: microtopographic basis for carbon monoxide-mediated sinusoidal relaxation. *J Clin Invest.* (1998) **101**: 604-612.
- 2) Hayashi S, *et al.* Induction of heme oxygenase-1 suppresses venular leukocyte adhesion elicited by oxidative stress: role of bilirubin generated by the enzyme. *Circ Res.* (1999) **85**: 663-671.
- 3) Makino N, *et al.* Altered expression of heme oxygenase-1 in the livers of patients with portal hypertensive diseases. *Hepatology.* (2001) **33**: 32-42.
- 4) Ozawa N, *et al.* Leydig cell-derived heme oxygenase-1 regulates apoptosis of premeiotic germ cells in response to stress. *J Clin Invest.* (2002) **109**: 457-467.

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc. If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at www.takara-bio.com. Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements. All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

Anti-Heme Oxygenase-1 (GTS-3), Monoclonal

Code No. M175

Size: 0.1 mg Mouse Ig

Subclass: IgG1

※ 適切に保存し、受取り後2年を目途にご使用ください。

●由来

ラットヘムオキシゲナーゼ-1遺伝子を導入したマウス由来T細胞形質転換株(WR19LrHO-1)のミクロソーム画分を免疫したマウスの脾臓細胞とマウス骨髄腫細胞P3U1を融合。こうして得られたハイブリドーマを、BALB/cマウスの腹腔内で増殖させて得られた腹水。

●製法

カラムクロマトグラフィーによりイムノグロブリン(IgG)として精製後、1.0%ウシ血清アルブミンを含む10mM PBS(pH7.4)に溶解して凍結乾燥。防腐剤を含みません。

●形状 凍結乾燥品

●抗体の還元

50 μ lの純水で溶解する(2.0mg/mlとなる)。これをストック溶液とし、使用時に希釈が必要な場合は下記の希釈液を用いる。全量を使い切る場合は、500 μ l以上の希釈液で直接溶解することもできる。

(注1)抗体濃度が低いと保存安定性が下がる可能性があるため、保存は必ず上記のストック溶液(2.0mg/ml)で行ってください。

(注2)還元した抗体溶液を4℃で保存する場合は、防腐剤として0.1%アジ化ナトリウムを添加してください。

●希釈液

10mM PBS (pH7.4)
1.0% ウシ血清アルブミン
(0.1% アジ化ナトリウム)*

*: 4℃で保存する場合は防腐剤として加えてください。

●特異性

- ・ヒト、ラットのヘムオキシゲナーゼ-1に反応し、ヘムオキシゲナーゼ-2に交差反応しない。
- ・ウサギ、マウスのヘムオキシゲナーゼ-1には反応しない。
- ・ヒト、ラットのヘムオキシゲナーゼ-1の活性を阻害する。

●使用抗体濃度

ウェスタンブロットリング(発色法)、免疫組織染色(発色法):

5~10 μ g/ml

ヒト・パラフィン切片の場合はGTS-1抗体(製品コードM174)が有効。

ラット・パラフィン切片の場合はGTS-3抗体(本製品)が有効。

●保存 4℃

本製品は防腐剤を含んでいません。還元後のストック溶液(2.0mg/ml)は必要に応じて分注し-20℃保存で1年、もしくは防腐剤(0.1%アジ化ナトリウム等)を加えて4℃保存で6ヶ月を目処にご使用ください。凍結融解の繰り返しは避けてください。また、希釈後の保存はなるべく避けてください。

●用途

- ・ウェスタンブロット法によるヘムオキシゲナーゼの検出
- ・パラフィン切片*および凍結切片の免疫組織染色
* 賦活化条件: Proteinase K 処理
- ・ヘムオキシゲナーゼ活性の阻害実験

●参考文献

- 1) Goda N, *et al.* Distribution of heme oxygenase isoforms in rat liver: microtopographic basis for carbon monoxide-mediated sinusoidal relaxation. *J Clin Invest.* (1998) **101**: 604-612.
- 2) Hayashi S, *et al.* Induction of heme oxygenase-1 suppresses venular leukocyte adhesion elicited by oxidative stress: role of bilirubin generated by the enzyme. *Circ Res.* (1999) **85**: 663-671.
- 3) Makino N, *et al.* Altered expression of heme oxygenase-1 in the livers of patients with portal hypertensive diseases. *Hepatology.* (2001) **33**: 32-42.
- 4) Ozawa N, *et al.* Leydig cell-derived heme oxygenase-1 regulates apoptosis of premeiotic germ cells in response to stress. *J Clin Invest.* (2002) **109**: 457-467.

●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。

本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201902Da